



HAKUMARU RES* (DRTG4873)

Zalecenia uprawowe

Odmiana Hakumaru RES* (DRTG4873) ma średnią odporność na wirus ToBRFV. Jest to odporność wielogenowa. W celu uzyskania maksymalnej zdrowotności roślin, mimo odporności na ToBRFV, pamiętajmy o zasadach prewencji fitosanitarnej. Sprawdź dostępne [artykuły](#) na stronie internetowej oraz filmy.

Jest to jedna z najnowszych propozycji w segmencie pomidorów malinowych z odpornością wielogenową na wirus ToBRFV.

Wielu producentów zdecydowało się na uprawę tej odmiany, a najczęściej wybierane terminy nasadzeń w tym sezonie to koniec grudnia i początek stycznia.

Już od kilku lat widzimy w okresie zimowym deficyty światła, a roślina, żeby pozostać w dobrej kondycji potrzebuje około 100 Juli na jedno grono i 150 Juli na części zielone.

Z tego względu przy produkcji Hakumaru RES w początkowym okresie uprawy należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą temperaturę w obiekcie i utrzymanie odpowiedniej wilgotności. Należy pamiętać aby przy niskiej radiacji nie przegrzewać roślin.

HAKUMARU RES* (DRTG4873)

Zalecenia uprawowe

Hakumaru RES jest odmianą o silnym wigorze, **lubi zatem aktywny klimat i odpowiednią różnicę temperatur między dniem a nocą**. Tutaj pomocna jest obserwacja roślin i sprawdzanie czy w wierzchołku widoczny jest odcień fioletu (jego brak oznacza zbyt wysoką średnią - dobową temperatur).

Utrzymanie aktywnego klimatu w szklarni to podstawa. W dni słoneczne średnia dobową powinna być nawet o 2 stopnie wyższa niż w dni pochmurne. Tak aktywny klimat pomoże wykorzystać dobrodziejstwo słońca, a rośliny nie będą miały zbyt słabych wierzchołków.

Aby w pełni wykorzystać światło docierające do roślin trzeba pamiętać o dozowaniu **CO₂**, który jest niezbędny do prawidłowej fotosyntezy. Przy zamkniętych wietrzniakach można bez problemu utrzymywać jego stężenie w ilości **800 ppm-ów**.

Podlewanie dostosowujemy do zaawansowania roślin. **Średnio przyjmuje się dawki podlewania po 100 ml na grono i 100 ml na części zielone**. Wraz ze wzrostem roślin oraz większą ilością światła zapotrzebowanie wodne roślin będzie się zwiększać.

Grona regulujemy do 4 owoców. Przy bardzo wczesnych terminach nasadzeń regulacje gron najlepiej wykonać po zawiązaniu owoców w gronie.

Hakumaru RES ma wysoki współczynnik LAI - **zazwyczaj od 4 grona proponujemy usuwanie jednego liścia z wierzchołka** (w zależności od kondycji uprawy i ilości światła zabieg ten można rozpocząć wcześniej). Usuwanie liścia kontynuujemy do połowy kwietnia.

*(Kod hodowcy: DRTG4873) *Nazwa odmiany w procesie rejestracji

Dołącz do nas   YouTube *Seminis & De Ruiter Polska*

Więcej informacji na www.vegetables.bayer.com

Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego pracowników lub agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności tych produktów, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer i wszystkie jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stnowią części żadnej umowy z żadnym z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustlono inaczej na piśmie. De Ruiter® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bayer Group. Wszystkie inne znaki towarowe występujące w tym materiale reklamowym są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Bayer Group, jednej z powiązanych z nią spółek zależnych lub innych i są wykorzystywane za ich zgodą.



Bayer Sp.z.o.o
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel +48 22 395 65 00