



HAKUMARU RES* (DRTG4873)

Zalecenia uprawowe

Odmiana Hakumaru RES* (DRTG4873) ma średnią odporność na wirus ToBRFV. Jest to odporność wielogenowa. W celu uzyskania maksymalnej zdrowotności roślin, mimo odporności na ToBRFV, pamiętajmy o zasadach prewencji fitosanitarnej. Sprawdź dostępne [artykuły](#) na stronie internetowej oraz filmy.

Tegoroczna zima zaskoczyła bardzo niskimi temperaturami i niską radiacją.

	Średnia radiacja	Średnia temperatura
1.01-14.02.2025	136J	2.1°C
1.01-14.02.2026	125J	-2.3°C

*Dane z okolic Kalisza

Takie warunki nie ułatwiają prowadzenia roślin, ich wzrost był zdecydowanie opóźniony, a producenci „walczyli” o utrzymanie pierwszego grona.

Zalecenia uprawowe



Włoszakowice, rozsada z początku stycznia.

W marcu dzień znacząco się wydłuża. Liczymy również na znaczną poprawę warunków pogodowych. Zbliżamy się do okresu największego obciążenia roślin i początku owocowania, które ze względu na dotychczasową pogodę może nieco się opóźnić. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na odbudowę systemu korzeniowego. Jest to czas, kiedy ma on trudne warunki do rozwoju. Polecamy zastosowanie preparatu wzmacniającego system korzeniowy oraz zadbanie o odpowiednią ilość przelewów (dzień pochmurny -5%, słoneczny- do 25%).

Również wierzchołek w tym okresie jest osłabiony. Nie należy jednak utrzymywać zbyt wysokich temperatur w szklarni w celu przyspieszenia dojrzewania pierwszych gron. Może to dodatkowo osłabić roślinę i w konsekwencji spowodować wykształcenie słabszych gron na górze.

*(Kod hodowcy: DRTG4873) *Nazwa odmiany w procesie rejestracji



HAKUMARU RES* (DRTG4873)

Zalecenia uprawowe

Hakumaru RES wymaga regulacji owoców w gronie w zależności od ilości światła, odmiany tej nie powinno się regulować na więcej niż 4 owoce.

W momencie kwitnienia 3-4 grona roślina ma już dużą powierzchnię blaszki liściowej.

Dlatego należy zwrócić uwagę na prawidłowe zarządzanie wilgotnością w szklarni.

W momencie kwitnienia 3-4 grona roślina ma już dużą powierzchnię blaszki liściowej.

Dlatego należy zwrócić uwagę na prawidłowe zarządzanie wilgotnością w szklarni.

Ilość dwutlenku węgla należy różnicować pomiędzy dniem pochmurnym, a dniem słonecznym. W dzień słoneczny wietrzniki zazwyczaj są otwarte, warto zatem ustawić w komputerze klimatycznym automatyczną korektę przy otwarciu wietrzników.

Większe nasłonecznienie i wydłużający się dzień sprawiają, że rośliny wyraźnie więcej transpirują.

W dzień słoneczny pierwszy cykl powinien być około 100J sumy radiacji, a koniec podlewania przypadać na około 2,5-3 godziny przed zachodem słońca. W dzień pochmurny rośliny mniej transpirują. Początek podlewania powinien być ok. 3 godzin po wschodzie słońca, a koniec na 3,5 godziny przed zachodem słońca.

Prawidłowe EC w macie w momencie pierwszych zbiorów wynosi pomiędzy 4,0 a 4,5 mS/cm.

W okresie największego obciążenia roślin uwagę należy zwrócić również na odpowiednie nawożenie. Dobrą praktyką będzie zwiększenie ilości potasu, co wpłynie na uzyskanie lepszej jakości owoców, ich szybsze wybarwienie i dojrzewanie. Zmniejszamy natomiast ilości azotu.

*(Kod hodowcy: DRTG4873) *Nazwa odmiany w procesie rejestracji

Dołącz do nas



Seminis & De Ruiter Polska

Więcej informacji na www.vegetables.bayer.com

Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego pracowników lub agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności tych produktów, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer i wszystkie jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z żadnym z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustlono inaczej na piśmie. De Ruiter® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bayer Group. Wszystkie inne znaki towarowe występujące w tym materiale reklamowym są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Bayer Group, jednej z powiązanych z nią spółek zależnych lub innych i są wykorzystywane za ich zgodą.



Bayer Sp.z o.o

Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel +48 22 395 65 00