

IR

ToBRFV
RESISTANCE

PINKMARU* (DRTG4876)

Zalecenia uprawowe

Odmiana Pinkmaru* (DRTG4876) ma średnią odporność na wirus ToBRFV. Jest to odporność wielogenowa. W celu uzyskania maksymalnej zdrowotności roślin, mimo odporności na ToBRFV, pamiętajmy o zasadach prewencji fitosanitarnej. Sprawdź dostępne [artykuły](#) na stronie internetowej oraz filmy:



Odmiana polecana do nasadzeń styczniowych.

Zalecamy szczepienie odmiany Pinkmaru na podkładce Maxifort lub Equifort.

Standardowe zagęszczenie: 2.4-2.5 pędów/m². Przy większym konieczne będzie usuwanie większej ilości liści w trakcie sezonu. Większa gęstość może mieć wpływ na zmniejszenie średniej masy owoców.

*(Kod hodowcy: DRTG4876) *Nazwa odmiany w procesie rejestracji

PINKMARU* (DRTG4876)

Zalecenia uprawowe

Pinkmaru* (DRTG4876) ma silny wigor i dobrze sprawdza się w uprawach nieszczepionych. Cecha ta wskazuje także konieczność generatywnego prowadzenia uprawy.

Zazwyczaj od 4 grona proponujemy usuwanie jednego liścia z wierzchołka (w zależności od kondycji uprawy i ilości światła zabieg ten można rozpocząć wcześniej). Usuwanie liścia kontynuujemy do końca kwietnia. Można tą czynność przedłużyć jeśli rośliny mają bardzo silny wigor i są mocno ulistnione. Generalnie zalecamy mniejszą ilość liści na roślinie ze względu na bardzo dużą blaszkę liściową.

Grona regulujemy do 4 owoców. Przy bardzo wczesnych terminach nasadzeń regulacje gron najlepiej wykonać po zawiązaniu owoców w gronie. Pinkmaru nie ma problemu z opadaniem owoców na początku sezonu.

Odmiana nie ma tendencji do spękań, dlatego owoce mogą dłużej zostać na roślinie. Pinkmaru charakteryzuje się owocami o bardzo dobrej jakości pozbiorczej.

W trakcie sezonu, zwłaszcza jeśli usuwanie liścia w wierzchołku nie było kontynuowane, może zaistnieć konieczność usuwania liści między gronami, w środkowej części rośliny.

Należy pamiętać o utrzymywaniu aktywnego klimatu i dobrej cyrkulacji powietrza wokół roślin, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia szarej pleśni.

W okresie letnim utrzymywać minimalną dopuszczalną ilość liści.

Odmiana nie ma tendencji do żółtej plamy, natomiast ze względu na możliwość wystąpienia suchej zgnilizny wierzchołkowej w trakcie wysokich temperatur dobrą praktyką jest cieniowanie szklarni lub używanie cieniówek w celu utrzymania lepszej wilgotności.

*(Kod hodowcy: DRTG4876) *Nazwa odmiany w procesie rejestracji

Dołącz do nas   YouTube *Seminis & De Ruiter Polska*

Więcej informacji na www.vegetables.bayer.com

Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego pracowników lub agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności tych produktów, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer i wszystkie jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z żadnym z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustlono inaczej na piśmie. De Ruiter® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bayer Group. Wszystkie inne znaki towarowe występujące w tym materiale reklamowym są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Bayer Group, jednej z powiązanych z nią spółek zależnych lub innych i są wykorzystywane za ich zgodą.



Bayer Sp.z o.o
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel +48 22 395 65 00