



HAKUMARU RES* (DRTG4873)

Za nami upalny początek lata, a przed nami.....?

Odmiana Hakumaru RES* (DRTG4873) ma średnią odporność na wirus ToBRFV. Jest to odporność wielogenowa. W celu uzyskania maksymalnej zdrowotności roślin, mimo odporności na ToBRFV, pamiętajmy o zasadach prewencji fitosanitarnej. Sprawdź dostępne [artykuły](#) na stronie internetowej oraz filmy.

Okres wakacyjny to zwykle czas wysokiego nasłonecznienia, wysokich temperatur, silnej transpiracji i szybkiego wzrostu owoców, dlatego najważniejsze jest utrzymanie stabilnego bilansu wody, właściwego klimatu i równowagi generatywno-wegetatywnej. Warto w tym okresie szczególnie zwrócić uwagę na jakość owoców.

1. Nawadnianie i sterowanie pożywką

- Stabilne nawodnienie mat, bez dużych wahań między porankiem a popołudniem.
- W dni słoneczne rozpocznij podlewanie wcześniej po wschodzie słońca, ale dopiero gdy roślina zaczyna aktywnie transpirować.
- Kończ nawadnianie odpowiednio wcześniej, aby mata zdążyła lekko przeschnąć przed nocą, ale nie dopuść do zbyt mocnego odwodnienia.
- Wysoka częstotliwość małych dawek jest zwykle lepsza niż rzadkie, duże cykle.
- Kontroluj różnicę EC między podawaną pożywką a matą. Jeśli EC w macie rośnie zbyt mocno, zwiększ udział przelewu lub skoryguj strategię startu i końca **podlewania**.



HAKUMARU RES* (DRTG4873)

Zalecenia uprawowe

Unikaj:

- przesuszania mat rano
- gwałtownego “zalewania” roślin po okresie stresu
- dużych skoków EC, bo sprzyjają pękaniu owoców i problemom z pobieraniem wapnia

2. Klimat szklarni

W wakacje priorytetem jest ograniczenie stresu cieplnego.

- Utrzymuj możliwie stabilną temperaturę:
- Wietrz intensywnie, ale bez gwałtownych skoków temperatury i wilgotności.
- Utrzymuj umiarkowaną wilgotność względną.
- Dąż do stabilnego deficytu wilgotności, unikaj skrajności:
 - zbyt “suchego” klimatu w południe
 - zbyt wilgotnych nocy

3. Równowaga wzrostu: generatywność vs wegetatywność

Jeśli rośliny są zbyt generatywne (objawy: cienki wierzchołek, krótkie liście, słabe przyrosty, drobniejsze owoce):

- zwiększ nieco uwilgotnienie mat rano
- skróć poranny stres wodny
- ogranicz nadmierne usuwanie liści
- pilnuj odpowiedniego poziomu azotu i wapnia

HAKUMARU RES* (DRTG4873)

Zalecenia uprawowe

Jeśli rośliny są zbyt wegetatywne (objawy: gruby wierzchołek, duże liście, opóźnione dojrzewanie, słabsze wiązanie):

- nieco zwiększ sterowanie generatywne
- wydłuż lekko czas do pierwszego podlewania
- utrzymuj dobrą ilość światła i przewiewność
- kontroluj obciążenie owocami



4. Prowadzenie roślin i pielęgnacja

- Regularnie usuwaj liście, ale nie za agresywnie podczas upałów.
- Zostaw odpowiednią powierzchnię asymilacyjną, bo latem roślina potrzebuje liści do odżywiania i ochrony owoców.
- Usuwać liście stare, chore i zacieniające grona, ale nie odsłaniaj nadmiernie owoców.
- Systematycznie opuszczaj i okręcaj rośliny.
- Kontroluj liczbę owoców w gronie. Warto utrzymywać wyrównane obciążenie, aby poprawić kaliber i jakość.

Podsumowując, najważniejsze latem są:

- ✓ stabilne nawodnienie i kontrola EC,
- ✓ ochrona przed stresem cieplnym,
- ✓ odpowiednie zaopatrzenie w wapń i potas,
- ✓ utrzymanie aktywnej powierzchni liści,
- ✓ monitoring jakości owoców, chorób i szkodników.

Dołącz do nas   YouTube *Seminis & De Ruiter Polska*

Więcej informacji na www.vegetables.bayer.com

Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot Grupy Bayer, jego pracowników lub agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym, podawane są w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności tych produktów, które mogą zależeć od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer i wszystkie jej podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej umowy z żadnym z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustłono inaczej na piśmie. De Ruiter® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bayer Group. Wszystkie inne znaki towarowe występujące w tym materiale reklamowym są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Bayer Group, jednej z powiązanych z nią spółek zależnych lub innych i są wykorzystywane za ich zgodą.



Bayer Sp.z.o.o
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel +48 22 395 65 00